



Gouldsamadin (*Chloebia gouldiae*)

Lämplighet

Gouldsamadinen är lämplig fågel för den som är intresserad av finkar. Den är fredlig fågel som lätt kan hållas med andra fåglar. Då den är ganska tystlåten är den lämplig att hålla i lägenhet. Gouldsamadin är mer värmekrävande andra finkar. Gouldsamadinen lever normalt i 5-6 år.

Ursprung

Gouldsamadinen förekommer i norra Australien, lokalt från Cape York-halvön och genom nordöstra Queensland, samt från norra Northern Territory till regionen Kimberley i Western Australia. I Queensland är den numera bara regelbundet känd från en enda plats inom sitt tidigare utbredningsområde. I Northern Territory och Western Australia är den vanligare. Den lever i flockar på grässavannen.

Utseende

Gouldsamadinen längd varierar mellan 11 – 14 cm. I naturen förekommer den i tre färger, svarthuvad, rödhuvad och gulhuvad. Honan är blekare i färgteckningen än hanen och det blå bandet runt bakhuvudet är smalare eller saknas helt. Det finns flera framavlede färger så som vit och blå. De utfärgas först efter 10 -12 månader.

Foder

Gouldsamadinen är en fröätare och grunden bör vara en finkfröblandning av god kvalitet. Komplettera med frukt, grönt och uppblöta eller grodda frön. Ge sparsamt med kraftfoder. Till skillnad från papegojfåglar behöver Gouldsamadinen tillgång till småkornig sand för sin matsmältning. Blanda gärna i snäckskal för att täcka behovet av kalkämnen.

Ljus

Fåglar kan lida av kalkbrist trots att de får tillräckligt med kalk i kosten. För att tillgodogöra sig kalk måste fågeln ha vitamin D. Vitamin D tillgodogör sig fågeln via UV-ljus som den får från solen eller speciella lysrör som finns speciellt för fåglar. Dessa byts ut varje år då de avtar i styrka. De bör sitta cirka 40 cm från den plats där fågeln tillbringar merparten av sin tid. Det bästa är dock om fågeln får ofiltrerat solljus (ej genom glas) på sig.

Buren

Då Gouldsamadinen gillar att stäcka på sig rekommenderas en mycket stor bur, gärna större än vad föreskrifterna anger. Många av de burar som finns att köpa är väldigt höga, vilket lurar köparen att tro att det är en stor bur. Volymmässigt stämmer det, men inte utrymmesmässigt. En fågel behöver utrymme vågrätt, inte i höjddled då den inte flyger lodrätt utan vågrätt. Sätt gärna in en bokorg där fåglarna kan övernatta. Burbotten skall täckas med något absorberande material. Sand, helst inte allt för finkornig är bra, men våt sand vill gärna fastna på fågelns fötter och kan orsaka inflammationer. Ett tjockt lager tillklippt tidningspapper går också bra och har den fördelen att man kan ta bort papper efter papper allt eftersom de blir nedsmutsade. En utmärkt bottenbeläggning är grov sågspån. Fågelns fötter hålls rena då spånen har hög absorptionsförmåga.

Handhavande

En Gouldsamadin blir sällan eller aldrig fingertam. Måste du fånga den, dämpa först belysningen och fånga fågeln försiktigt. Lagg fågeln med rygg och vingar i handflatan.

Hemkomsten

Låt den själv klättra ur transportburen och in i buren som förberetts med mat och vatten. Låt den sitta i lugn och ro första dygnet. Närma er buren försiktigt, småpratande och med lugna rörelser. Om fågeln inte äter och dricker andra dagen, kontakta säljaren.

Skötsel

Mat, frukt och grönt och vatten byts dagligen, oftare om det är förorenat. Rengör mat och vattenskålar dagligen och bur och sittpinnar minst en gång i veckan. Ta bort bajs och matrester från botten dagligen då det annars bildas bakterier. Gouldsamadinen bör inte vistas i utrymmen som understiger 15 grader under längre tid. Då Gouldsamadinen är mycket känslig för luftföroreningar ska man ej röka inomhus.

Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2014:17, Saknr L 80) hur man håller en fågel

- Buren ska vara minst 0,7 x 0,45 m och 0,6 m hög. Buren ska berikas med saker att klättra på. Det ska finnas foderanordningar som stimulerar födosöksbeteende. Berikningsföremål ska bytas ut med så täta intervall att fågeln inte tappat intresset och slutar använda föremålen.
- Fåglar som i naturen lever i par ska hållas i par eller grupp, man bör därför inte ha en kanariefågel utan minst två av samma art.
- Fåglar bör dagligen ha tillgång till utrymmen där de kan utföra naturliga rörelsemönster såsom att flyga fritt.
- Fåglar ska hållas i en berikad miljö som stimulerar dem att utföra sina naturliga beteenden och förhindrar att de utvecklar beteendestörningar.
- Badande sällskapsfåglar ska ha rent badvatten. Fågelbadets utformning och djup ska vara anpassat till fåglarnas storlek och art. Ett fågelbad får inte vara djupare än att fåglarna bottnar.

Sjukdom

Gouldsamadinen är ganska tåliga fåglar som sällan blir sjuka. Tecken på sjukdom är minskad aktivitet, lös eller missfärgad avföring, uppburrad fjäderdräkt, matta ögon eller att fågeln andas med öppen näbb. Tror du att din fågel är sjuk, kontakta en fågelkunnig veterinär omedelbart då sjukdomsförloppet ofta är mycket snabbt i väntan på veterinärbesök, placera din fågel i ett fuktigt uppvärmt rum ca 30 grader. Använd inte värmelampa, då det punktvis kan bli för varmt.

Litteratur

Gouldian Finches (Complete Pet Owner's Manual) av Gayle A. Soucek, Barrons förlag, 2008

Gouldian Finches: Everything About Purchase, Housing, Care, Nutrition, Breeding, and Diseases av Matthew M. Vriends, Barrons förlag, 1991

A Guide to Gouldian Finches and Their Mutations av Milton Lewis, ABK Publications, 2005



Tamfågel.se